

Aderidae		EM05(107); L16(43-47);
Aderus		
	populneus	E54(28,185); E77(96); E85(111,112); E87(48); E88(84); E90(88); L19(19);
Anidorus		
	nigrinus	E53(160); E54(185); O68(212); E02(218); E04(69); E08(68);
Euglenes		
	nitidifrons	SfNKr(86); E49(88,151,153); E50(213,219); E64(42); O65(200); S72(295); E75(101,112); E79(31); S80(346); EM96(258); Z98(36); E01(121); E02(218);
	oculatus	NETXII(111,112); E49(151); E50(70,219); E53(17,67,178); E64(42); O66(175); O68(212); E75(112); S80(346); E81(141,145); E86(55); E01(122); E02(210,218); E08(60,68,110,119,161);
	pygmaeus	E21:3(Appendix 1);
Phytobaenus		
	amabilis	E78(124); E87(70); E93(91);
Pseudanidorus		
	pentatomus	E52(21); E68(246); O68(212); S70(21-29); S72(295); E75(112); E77(92); E84(134); E91(36); E03(142,143,155); L16(31); L17(32); E21:3(Appendix 1);
Vanonus		
	brevicornis	S70(21-29); E72(180); E78(124); E93(84,91); E97(122); Z22(43);