

Corylophidae		
Arthrolips		
	obscura	E87(47);
Clypastraea		
	pusilla	E49(148,154); E78(122); E87(70); E89(144); E91(36); E97(51,120);
Corylophus		
	cassidoides	E50(129); E19(128);
Orthoperus		E50(152); E71(66,67);
	atomarius	E88(43);
	atomus	E38(57,63,118,121); E47(6,7); E48(73); E53(171); E63(245); O68(200); EO72(39); E74(87); E79(29); E84(134); E85(109); E96(140); E04(69); E21:3(Appendix 1);
	brunnipes	E84(134); E87(58); E94(123); E97(51); E18(157);
	corticalis (improvisus)	E49(84); E50(65); E53(171); E54(64); E55(42); E61(77); E66(51); O68(200); E80(148); E84(134); E88(43);
	nigrescens	E53(171); E54(14); E59(19); E80(148); E88(43); E91(36);
	punctatus	
	rogeri (punctulatus)	E50(98); E55(43); E74(87); O68(200); E84(134);
Rypobius		
	cassidoides	O50(206); O55(109); O62(157); E65(18,19); E99(155); E06(106);
Sericoderus		
	lateralis	E50(216); E54(183); E63(243); O65(191); E73(209,210); E78(38); E79(36); E80(142,148); E87(47); E88(43); E18(157);