

Phalacridae		
Olibrus		
	aeneus	E50(69); E77(93); E78(38); Z20(45);
	affinis	E51(47); O62(167); O68(210); E87(57);
	baudueri	E47(175); E54(189);
	bicolor	E04(217);
	bimaculatus	E38(64); E47(175); E49(68); E50(69); O65(199); O68(210); E83(176); E04(217);
	corticalis	E62(151); O68(210); E97(182);
	flavicornis	NET18(49,50); E47(175); E49(87); E52(20); O65(199); O68(210); E77(96); E80(149); S80(43,346); E81(43); E19(128);
	millefolii	E50(69); E83(124); E88(84);
	norvegicus	
	pygmaeus	E50(69); E81(20); Z89(20);
Phalacrus		E47(179-183);
	caricis (nigrinus)	S73(198); E21:3(Appendix 1);
	championi	E47(182); E48(95); E52(20); E62(151); O62(167); E87(57); E22(54,60);
	corruscus	E37(163); E50(69,217); E80(149); E83(124); E87(125);
	fimetarius	E86(149); E88(84); E90(89); Z94(29); L01(60);
	grossus (dieckmanni)	E86(149); E06(124);
	substriatus	E36(198); E50(174); E56(54); E62(194); S73(198); E83(124); E18(157);
Stilbus		
	atomarius	O68(210);
	oblongus	E50(217); E97(180,182);
	testaceus	E50(69); O68(210); E78(38); E83(124);